



## Delici-Kesici Alet Yaralanmalarında Yapılması Gerekenler



- **Yaralı bölgeyi su ve sabun ile yıkayınız**
- Cilt antiseptiği (%70 alkol, %10 povidon iyot) ile siliniz.
- Yaralı bölgeyi sıkmayın ve kanatmaya çalışmayın.
- İnceleme, takip ve tedavi için mesai saatleri içinde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine, mesai saatleri dışında Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurun.

Her türlü bilgi ve danışmanlık için  
İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesini  
arayabilirsiniz.

Telefon: 0 (212) 4143000-21971  
E-posta: ctfhekk@istanbul.edu.tr



İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi



Delici-kesici alet  
yaralanmalarından korunma  
önlemleri bilgilendirme broşürü  
(sağlık çalışanları için)





## Kesici-Delici Alet Yaralanması Nedir?

Kan vb. vücut materyali ile kontamine olmuş kesici-delici her türlü materyal ile derin perkütan yaralanmadır.

## Kesici-Delici Alet Yaralanması İle Bulaşma Riski Yüksek Enfeksiyon Hastalıkları Hangileridir?


Kesici delici alet yaralanmalarında en kolay bulaşabilen enfeksiyon B hepatitidir. Hepatit B, Hepatit C ve HIV pozitif hastaların kan veya vücut materyelleri ile kontamine olmuş kesici-delici alet yaralanmalarında bu enfeksiyonların bulaşma riski (yüzdesi) ve belirtilerin ortaya çıkması için gereken süreler (kuluçka süresi) sırasıyla aşağıdaki gibidir.

**HBV:%30; Kuluçka Süresi:50-180 gün**

**HCV:%3; Kuluçka Süresi: 30-150 gün**


**HIV:%0.3; Kuluçka Süresi:30-90 gün**

Ü. CTF. 2007-2009 Kesici-Delici Alet Yaralanması Grafiği



## Kesici-Delici Alet Yaralanmaları En Fazla Hangi Durumlarda Gelişir?

İğne ucunun kapağını kapatmaya çalışırken



Ameliyat esnasında

Hastaya yapılan her türlü invaziv girişim sırasında



Hastaya yapılacak parenteral tedavinin hazırlanması yada uygulanması aşamasında



Tıbbi atıkların toplanması taşınması esnasında



## Kesici-Delici Yaralanmadan Korunma

Kan ve her türlü vücut sıvısı ile temasta eldiven kullanınız. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerinizi mutlaka su ve sabun ile yıkayınız.

İğne uçlarını kullandıktan sonra kapaklarını kapatmadan sarı tıbbi atık kovasına atınız

İğne ucu, bistüri, lam, lamel, kırılmış ampul, vb. kesici-delici atıkları sarı tıbbi atık kovası içine atınız. Tıbbi atıkların güvenli ve doğru bir şekilde kaynağında ayrılmasını, toplanmasını ve geçici atık deposuna taşınmasını sağlayınız.

Yaralanma sonrasında bağışıklanma, takip ve tedavi için acilen; mesai saati içinde Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesine; mesai saati dışında Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'na başvurun.



**Hasta ile temas öncesinde ve sonrasında mutlaka el hijyeni sağlayınız**