



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
İLAÇ -BESİN ETKİLEŞİM LİSTESİ

KULLANILAN İLAÇ	TİCARİ İSMİ	ETKİLEŞİMİ OLAN BESİNLER	ÖNLEMLER
ANTİKANSER İLAÇLAR			
ETOPOSİT	Lastet	Greyfurt	En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
<u>Siklofosfamid</u>	<u>Endoxan</u>	greyfurt ve alkolle etkileşimi mevcuttur.	Aç karna alınmalıdır
<u>İbandronik asit ():</u>	<u>bondronat</u>	süt ve gıdalar emilimini önleyebilir.	Sabah yemeklerden 1 saat önce bol su ile alınmalı, hastaya ilaç alındıktan sonra en az bir saat süreyle yatmaması gerektiği söylenmelidir. Özofajit yapabilir.
<u>Sutent-</u>	<u>sunitinib</u>	greyfurt	?
<u>Xeloda-</u>	<u>kapasitabin</u>		Sabah akşam tok karna kullanılmalıdır.
<u>Tamoksifen:</u>		Alkolden	Günde tek doz yada ikiye bölünmüş halde kullanılabilir. Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir. Hastalar adet görmedikleri halde gebe kalabilecekleri konusunda uyarılmalıdır. Yıllık kadın doğum kontrolü önerilir.
ANTİBİYOTİKLER			
SİPROFLOKSASİN	Ciflosin, Ciprasid, Cipro, Loxasid, Proxacin, Sanset, Sifloks, Siprosan	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
<u>Rifampisin</u>	Rifocin ampül	Alkol	Gebeliğin ilk trimesteri ve laktasyonda verilmemelidir.
ANTİFUNGAL İLAÇLAR			
	Fungan, Fluzole	Süt, yoğurt, alkol	Etki azalması.
KAN SULANDIRICILAR			
VARFARİN	Coumadin, Orfarin	1. K vitamininden zengin besinler (yeşil sebzeler, yonca, ıspanak, kurubaklagiller, balık) 2. E vitamini (yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar, tahıl taneleri, kuru baklagiller) 3. 1 litreden fazla dondurma	Kemoterapi alan hastalarda kullanılmamakta, bu hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinler tercih edilmektedir coumadini ışıktan korumalı, her akşam aynı saatte ilacı almalı ve sorun olmadığı müddetçe ayda bir INR kontrolünü yaptırmalıdır. Kanama olduğunda en yakın hastaneye başvurması gerektiği hastaya söylenmeli

ACE İNHİBİTÖRLERİ			
KAPTOPRİL, ENALAPRİL, KİNAPRİL, TRANDOLAPRİ	Kapril, Enalap, Enapril, Vasolapril, Accuzide, Delix, İnhibace, Tarka, Gopten	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır
DIÜRETİKLER			
TRİAMTEREN, AMİLORİDE, SPİRONOLAKTON	Aldactazide, Aldactone	Potasyumca zengin besinler (muz, kayısı, turunçgiller, patates)	Birlikte kullanılmamalıdır
Ca KANAL BLOKERLERİ			
NİFEDİPİNE, VERAPAMİL, AMLODİPİN, DİLTİAZEM	Adalat, Nidicard, Isoptin, Veroptin, Tarka, Amlodis, Monovas, Norvasc, Vasocard, Dilticard, Diltizem	Greyfurt suyu, meyan kökü	Birlikte kullanılmamalıdır.
KARDİYAK GLİKOZİTLER			
DİĞİTOKSİN	Digitoksin	Meyan kökü	Kesinlikle kullanılmamalıdır.
STATİNLER			
ATORVASTATİN	Ator, Lipitor, Kolestor	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
BRONKODİLATÖRLER			
TEOFİLİN	Bronkolin, Teobag	Çay, kahve, çikolata gibi kafein içeren besinler	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
MSS İLAÇLARI			
MİDAZOLAM, DİAZEPAM, ALPRAZOLAM, LORAZEPAM	Dormicum, Diazem, Nervium, Xanax, Ativan	Greyfurt suyu	Birlikte kullanılmamalıdır.
Laroxyl 10-25 mg tb- amitriptilin:		Alkol	
Jurnista-hidromorfon-		Alkol	Bağımlılık yapabilir. Bütün olarak kullanılmalıdır. Aniden kesilmemelidir. Astım, solunum sıkıntısı, kontrolsüz KİBASı olan yada şuuru kapalı hastalarda verilmemelidir. Hipotansiyonda verilmemelidir
Durogesic-fentanil TTS:		Alkol	72 saatte bir değiştirilir, kuru, temiz yarasız cilde yapıştırılır, kesilmemelidir. Çıkarıldıktan sonra da 24 saat süreyle hastanın takibi gerekir. Solunum depresyonu ve bağımlılık yapabilir.
FENİTOİN	Phenytoin	K vitaminleri (ısırgan, balık, kabak, karnabahar, karaciğer), D vitaminleri (balıkyağı, süt, tereyağı)	Tüketimi sınırlandırılmalıdır.
VİTAMİNLER			
C VİTAMİNİ	Vitabiol-C	Süt	En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.

<u>Norodol-haloperidol-nöroleptikler:</u>		Alkol	Enjeksiyon aralarında en az 3 saat olmalıdır. Merkezi sinir sistemi ve solunum depresyonu yapabilir.
<u>Xanax-alprazolam</u>		Alkol	Uyku yapar. Bağımlılık yapar. Aniden kesilmemelidir.
<u>Ativan-lorezipam</u>		Alkol	Solunum depresyonu ve bağımlılık yapabilir.
<u>Fenitoin- Epanutin- Epdantoin</u>		Alkol	
		Alkol	
ANTIASİTLER			
ALUMİNYUM İÇERENLER	Gaviscon, Mucaine, Talcid	Portakal suyu	En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
DEMİR PREPARATLARI			
	Ferrosanol Duodenal, Ferrum Fort, Ferplex, Ferrosanol	Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler)	En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır.
ANTIENFLAMATUVAR İLAÇLAR			
SULFASALAZİN	Salazopyrin	Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek)	Birlikte kullanılmamalıdır.
ASETİLSALİSİLİK ASİT	Aspirin	C Vitamini, Folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, ıspanak, bezelye, portakal, mercimek), Demir (tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)	Etki azalması.
KORTİZONLU İLAÇLAR			
	Dekort, Prednol, Prednisolon	Tuz, şeker, süt, yoğurt, peynir	Birlikte kullanılmamalıdır.
TİROİD İLAÇLARI			
TİROİD HORMON	Levotiron, Tefor	Soya fasulyesi, şalgam, lahana	Salgıyı inhibe eder.