



**İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÖNCESİ  
HASTA BİLGİLENDİRME FORMU**

**Değerli Hastamız;**

BT çekimleri öncesinde aşağıda belirtilenlere özen göstermeniz, işlemlerinizin daha sağlıklı ve hızlı yürümesini sağlayacaktır.

**DİKKAT: İyotlu kontrast madde alerjiniz, şeker hastalığınız, böbrek yetersizliğiniz, quatr hastalığınız (tiroid bezi aşırı çalışması) varsa hekiminizi bu konuda bilgilendirmeniz çok önemlidir.**

**BT İçin Hastanemize Gelirken:**

- Varsa önceden yapılmış radyolojik tetkiklerinizi (filmleri ve sonuçlarını) yanınızda getiriniz.
- Doktorunuz tarafından doldurulmuş, BT istek formunuzla birlikte BT bölümüne müracaat ediniz.

**BT İncelemesi İçin Gerekli İlaçlar ve Malzemeler:**

- **Tüm Batın BT**
  - 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg l/ml)
  - 50 ml iyonik iyotlu kontrast madde (Ürografin %76, 18.5 gr)
  - 50 cc rektal enjektör
  - 1.5 lt pet şişe su
- **Üst Batın BT**
  - 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg l/ml)
  - 50 ml iyonik iyotlu kontrast madde (Ürografin %76, 18.5 gr)
  - 1.5 lt pet şişe su
- **Göğüs (Toraks) ve Kranyum (Beyin) BT**
  - 100 ml noniyonik iyotlu kontrast madde (300-400 mg l/ml)

**Tüm Batın BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar:**

- Tüm batın BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız ilaçları kullanmaya devam ediniz.
- Hekiminiz tarafından çekim sırasında **damardan (IV)** kontrast madde uygulanması uygun görülmüşse bu işlem BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından uygulanır.
- Hekiminiz tarafından çekim sırasında **ağızdan (Oral) ve makattan (Rektal)** kontrast madde uygulanması uygun görülmüşse lütfen aşağıdaki gibi uygulayınız;
- 1,5 lt pet şişe su içine 50 ml Ürografin karıştırın.



## İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) ÖNCESİ HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

- BT çekiminden 1-1.5 saat önce içmeye başlayın ve her 10 dk. da 2 bardak için. Son 3 bardaklık kısmı saklayın. Son 2 bardaklık kısmı (100 ml) incelemeden hemen önce için.
- Oral kontrast maddenin son 1 bardaklık kısmı (50 ml) incelemeden hemen önce hemşireniz tarafından makattan uygulanır.

### Üst Batın BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar:

- Üst batın BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız ilaçları kullanmaya devam ediniz.
- Hekiminiz tarafından çekim sırasında **damardan (IV)** kontrast madde uygulanması uygun görülmüşse bu işlem BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından uygulanır.
- Hekiminiz tarafından çekim sırasında **ağızdan (Oral)** kontrast madde uygulanması uygun görülmüşse lütfen aşağıdaki gibi uygulayınız:
- 1,5 lt pet şişe su içine 50 ml Ürografin karıştırın.
- BT çekiminden 1-1.5 saat önce içmeye başlayın ve her 10 dk. da 2 bardak için. Son 2 bardaklık kısmı saklayın. Son 2 bardaklık kısmı (100 ml) incelemeden hemen önce için.

### Toraks (Göğüs) ve Kranyum (Beyin) BT İncelemesi İçin Gerekli Hazırlıklar:

- Göğüs ve Beyin BT öncesinde 5 saat aç kalmanız gereklidir. Ancak sıvı alabilirsiniz ve kullandığınız ilaçları kullanmaya devam ediniz.
- Çekim sırasında uygulanacak kontrast madde BT çekiminden hemen önce hemşire tarafından damardan uygulanır.