



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
EXTRAVAZASYON BAKIM TALİMATI

Doküman No : OE-KT-PR-001/TL-004
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 1 / 2

1. Amaç

Bu talimatın amacı ekstrevasasyon gelişmesi durumunda yapılacak işlemleri tanımlamaktır.

2. Kapsam

Bu talimat ekstrevasasyon olaylarını kapsar.

3. Tanımlar

Ekstrevasasyon: Sıvının damardan doku aralıklarına sızması.

4. Sorumlular

İÜ Onkoloji Enstitüsü Hemşireleri ve Hekimleri

5. Uygulamalar

5.1. Kemoterapi ilaçlarının uygulaması kesinlikle deneyimsiz hemşireler tarafından yapılmaz.

Kemoterapik ilaç uygulanan ven şişme, kızarıklık ve ağrı açısından gözlemlenir.

Hasta, bu belirti ve bulgulardan birini veya birkaç tanesini hissetmesi durumunda hemşireye bilgi vermesi konusunda bilgilendirilir.

Kemoterapik ilaç intravenöz şeklinde uygulanıyorsa kanın geri dönüşü 5-10 dakikada, iv puşe olarak uygulanıyorsa 2-3 cc' de bir damar yolu açıklığı kontrol edilir.

Kateterin ilaç verilmeden önce ve infüzyon bitiminde 5-10 dakika %0,9 NaCl ile irrigasyonu sağlanacak.

5.2. Kemoterapi uygularken hastanın ağrı, kızarıklık, şişlik, kaşıntı, yanma gibi şikayetleri olursa;

- İnfüzyonu durdurun ve deneyimli birinden yardım isteyin.
- IV kateteri çıkarmadan enjektörle geri çekebildiğiniz kadar sıvıyı geri çekmeye çalışın.
- Hastanın primer hekimine haber verilir.
- Ekstrevasasyon gelişen ekstremitayı elevasyonda tutun.
- Olaya sebep olan ilaç grubuna göre aşağıdaki adımlar izlenir.

5.4. Eğer damar dışına çıkan antrasiklin grubu (Adriamycin, Epirubicin, Doksorobicin) bir ilaç ise;

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM



İÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
EXTRAVAZASYON BAKIM TALİMATI

Doküman No : OE-KT-PR-001/TL-004
İlk Yayın Tarihi : 05.10.2017
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi :
Sayfa No : 2 / 2

- 5.4.1.** Extravazasyon gelişen yere 15 dakikada bir 15 dakika boyunca soğuk uygulama yapılır. Uygulama yapılırken alana doğrudan basınç uygulanmaz. Buz yanığı gelişmemesine dikkat ediniz.
- 5.4.2.** Soğuk uygulamaya 24-48 saat boyunca günde 4 kez devam edilir.
- 5.5. Eğer damar dışına çıkan ilaç bir Vinca Alkaloid'i (Oncovin, Navelbine, Vincristine, Velbe) ise ;**
- 5.5.1** Extravazasyon gelişen yere 15 dakikada bir 15 dakika boyunca ılık uygulama yapılır. Uygulama yapılırken alana doğrudan basınç uygulanmaz.
- 5.4.2.** Ilık uygulamaya 24-48 saat boyunca günde 4 kez devam edilir.
- 5.6.** Hastaya yukarıda gerekli görülen uygulamalar yapıldıktan sonra **“Olay Bildirim Formu”** doldurulur.
- 5.7. “Extravazyon İzlem Formu”** hastanın tedavisini uygulayan hemşire tarafından doldurulur ve hasta dosyasının sistemik tedavi separatörünün arkasına yerleştirilir. Hastaya **“Ekstravazasyon Evde Bakım ve Bilgilendirme Formu”** verilir.
- 5.8.** Hastanın ekstravazasyon bölgesinin çekilen fotoğrafları dosyasında saklanır.

6. İlgili Dökümanlar

- 6.1.** Olay Bildirim Formu
- 6.2.** Extravazyon Evde Bakım ve Bilgilendirme Formu
- 6.3.** Extravazasyon İzlem Formu

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	ONAYLAYAN
SÜREÇ SORUMLUSU	KALİTE TEMSİLCİSİ	BAŞHEKİM