



T.C.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
İnfeksiyon Kontrol Komitesi



Sayı :53241543-045.01-
Konu :Normalleşme Sürecinde
Ameliyathanelerdeki Önlemler

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Pandemi döneminin normalleşme sürecine girildiğinde, hastanemizdeki cerrahi operasyonların öncesinde, sonrasında ve operasyon sırasında ameliyathanelerde uygulanması gereken, hasta, sağlık çalışanı ve ortama ilişkin infeksiyon kontrol önlemleri önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır.

1. Cerrahi birimlere başvuran tüm hastalar, ameliyat öncesi değerlendirme ve ön hazırlık aşamasında COVID-19 olası vaka tanımı yönünden de sorgulanır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığının COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberine göre (<https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi>) hastalarda COVID-19 yönünden aşağıdaki belirti ve bulgular aranmalıdır.

- Ateş
- Öksürük
- Nefes darlığı
- Boğaz ağrısı
- Baş ağrısı
- Kas ağrıları
- Tat ve koku alma kaybı
- İshal

Bu belirti ve bulguları, başka nedenlerle açıklanamayan her hasta hastanemizdeki COVID-19 hastalarının değerlendirildiği alana yönlendirilmelidir. COVID-19 vaka tanımıyla ilişkili herhangi bir belirti ve bulgusu olmayan hastalardan "COVID-19 olmadığına dair" konsültasyon notu talep edilmesi uygun değildir.

2. Genel anestezi altında ameliyat edilmesi gereken hastadan preoperatif hazırlık aşamasında (ameliyattan en az 48 saat önce) SARS-CoV-2 PCR testi istenmelidir. Ameliyat edilinceye kadar hastaya temas ve damlacık izolasyonu koşulları sağlanmalıdır. Test sonucu negatif olan hastada COVID-19 kuşkusu yoksa ikinci kez test istenmesi önerilmez. İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nin elektif cerrahi işlemlerle ilgili önerileri arasında belirtildiği gibi (04.05.2020 tarih ve 78606 sayılı yazı), hastada COVID-19 kuşkusu yoksa rutin olarak toraks BT çekilmesi uygun değildir. Hastanın preoperatif SARS-CoV-2 PCR testi pozitif olarak bulunursa hastanemizdeki COVID-19 hastalarının değerlendirildiği alana yönlendirilmelidir.

3. Ameliyat odalarının filtreleri gözden geçirilmelidir. Filtrelerin bakımı ve değişiminde çalışan personel N95 maske kullanmalıdır.

4. Ameliyat odalarının kapıları kapalı tutulmalı ve ameliyat sırasında giriş çıkışlar önlenmelidir. Ara bölmeler ve sterilizasyon ünitesi gibi alanların kapıları da kapatılmalıdır.

Doğrulamak için:<http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BE8VR5706>

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Zeynep MEMİŞ

Tel : 0 212 414 21 38 Faks : 0 212 414 20 25/0 212 635 11 93
e-posta : iubilgi@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr





T.C.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
İnfeksiyon Kontrol Komitesi



5. Ameliyat odalarında vaka için gerekli olmayan aletler bulundurulmamalıdır.
6. Ameliyata katılacak tüm ekip (anestezist, operatör, hemşire, hasta bakıcı ve temizlik görevlisi) aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanın (KKE) tümünü giyerek çalışmalıdır.
 - N95 maske + üzerine cerrahi maske
 - Steril cerrahi önlük
 - Tek kullanımlık steril eldiven
 - Gözlük/yüz koruyucu
 - Tek kullanımlık bone
 - Tek kullanımlık ayak koruyucu/galoş
7. İntübasyon, ameliyat odasında yapılmalı; anestezi indüksiyonu ve intübasyon tamamlanana kadar gerekli personel dışındakiler ameliyat odasının dışında olmalıdır.
8. Belirlenmiş ve gerekli olan ekibin ameliyata girmesi, acil durumlar dışında ekibin değişmemesi gerekir.
9. Ameliyata katılacak tüm ekip zamanında odada olmalı, ameliyat bitmeden çıkmamalıdır.
10. Her vaka için gerekli olan en az malzeme kullanılmalıdır. Ameliyat odası dışından bir malzeme gerekiyorsa dışarıdan bir personel getirmelidir.
11. Cerrahi işlemlerde aerosol oluşturan yöntemlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
12. Ayılma süresi ameliyat odasında geçirilmeli, hasta servise veya yoğun bakım ünitesine, ayıldıktan sonra transfer edilmelidir.
13. Her ameliyat sonrasında havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için bir sonraki ameliyata kadar en az 30 dakika ayrılmalıdır.
14. Tek kullanımlık KKE çıkarıldıktan sonra kırmızı atık kutusuna atılmalı ve el hijyeni ihmal edilmemelidir.
15. Üzerine cerrahi maske takılarak kullanılan N95 maske 8 saat süreyle kullanılabilir.
16. Ameliyathane çalışanları, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün kendisini sorgulamalıdır. Semptomları olan kişi amirine haber vererek olası vaka tanımına göre yönetilmelidir.
17. Postoperatif dönemde COVID-19 gelişirse, hastanın tedavisine, ilgili cerrahi birimde gerekli infeksiyon kontrol önlemleri altında izolasyonu sağlanarak devam edilir.

Saygılarımla

e-İmzalı
Prof. Dr. Ömer Haluk ERAKSOY
Başkan

Doğrulamak için: <http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BE8VR5706>

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Zeynep MEMİŞ

Tel : 0 212 414 21 38 Faks : 0 212 414 20 25/0 212 635 11 93
e-posta : iubilgi@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr





T.C.
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
İnfeksiyon Kontrol Komitesi



Doğrulamak için: <http://194.27.128.66/envision.Sorgula/belgedogrulama.aspx?V=BE8VR5706>

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Zeynep MEMİŞ

Tel : 0 212 414 21 38 Faks : 0 212 414 20 25/0 212 635 11 93
e-posta : iubilgi@istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr

