



# Splint-Bandaj uygulama

- Orta radius ve distal tibia kırıkları dahil distaldeki kırıklarda splint uygulanabilir
- Humerus ve femur kırıklarında kullanılmaz
- PVC cebire destekli
- Alçı destekli

# Alçı Uygulama

- Normal-Plastik alçı
- 150 kg'ın altındakilere  
4-6 tabaka alçı
- Daha ağırlar için  
8-12 tabaka alçı
- Alçı içine birbirine 90  
derece açılı cebire



# Alçı uygulaması

- 1 aylıktan küçüklerde 3 haftada bir
- 1-6 aylık arası 4 haftada bir
- 1 yaşından büyüklerde 6-8 hafta sonra değiştirilir.

## 2. Falanks kırığı



# Thomas splint-alçı uygulaması

- Plastik bir boru ile proksimal bölümün ölçüsü alınır
- Lateral ve dorsal halkalar
- Arkada femurun troc.major'una
- Önde spina skapula dorsaline uzanır.



# Thomas splint

Tubuler ubuklar  
kullanılır

140 kg'dan az olanlarda  
6.35 mm ap

140-500 kg arası  
1.25 cm ap

500 kg' dan buyklerde  
2.5 cm ap

Halka iin 540-630  
derece bklr

8 haftada yerinde tutulur













Tibia kırığı 1000  
kg

## 2.Falanks kırığı





Radius kırığı