SİLİVRİ BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burçin SARISALTIKOĞLU
Veteriner İşleri Müdürü
Veteriner Hekim

23.10.2025

Zoonoz Hastalıkları Önleme Konusunda Silivri Belediyesinin Çalışmaları

Zoonoz Hastalıklar
Genel Bakış

- İnsanlara ait enfeksiyon hastalıklarının **% 60'**ı zoonoz,
- Önemli halk sağlığı problemi olan hastalıkların **% 75**'i zoonoz,
- Biyolojik silah olarak kullanılabilecek etkenlerin ise **% 80**'i zoonoz niteliklidir.
- Zoonotik hastalıklar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı problemidir.
- Bu hastalıklardan başlıcaları; ***bruselloz, şarbon, tularemi, kırım-kongo kanamalı ateşi, kuduz, kistik ekinokokkoz,***
- Diğerleri; ***kuş gribi, toksoplazmoz, batı nil virüsü, zika virüsü, dengue virüsü, chikungunya ateşi, sarı humma, leishmaniasis, şark çıbanı, kala azar, leptospirozis, hanta virüsü, lyme, q ateşi*** *vb.* olarak sıralayabiliriz.

Halk Sağlığı Problemi Olma Sebepleri

- Ülke nüfusunun önemli bir kısmının çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşması; bu işlerin gelenekler çerçevesinde yapılması,
- Toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyindeki iyileşmede yeterliliğin sağlanamaması,
- **Çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliği** anlayışlı sistemin uygulamaya konulamaması,
- Hayvan sahiplenme ile ilgili hukuki alt yapı yetersizlikleri,
- Toplumsal yaklaşımdaki olumsuzluklar,
- Zoonotik hastalıklarla ilgili olarak hayvanlarda yapılan mücadelede yeterliliğin temin edilememesi,
- İlgili kurum ve kuruluşlar arasında gerekli iş birliğinin sağlanamaması,

Bruselloz
Genel Bakış

- Ülkemizde sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden insanlara bulaşan yaygın olarak görülen bir zooonotik hastalıktır.
- Hastalık etkeni; Brucella bakterisidir. (B.melitensis, B.suis ve B.abortus)
- Hastalığın bulaşması; hastalık insanlara en sık enfekte hayvan ürünlerinin pastörize edilmeden tüketilmesi (süt, peynir, krema vb.) ile bulaşmaktadır. Enfekte hayvan dokularına (yavru atıkları, atık materyalleri, doğuma müdahale) bütünlüğü bozulmuş deri ve mukozanın doğrudan temas yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.
- Hastalığın belirtileri; ateş en sık görülen semptom olup gece terlemesi, huzursuzluk, kas ve eklem ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, uykusuzluk, baş ağrısı, ateşe eşlik eden bulgulardır. Kronik hale geçtiğinde kemik, merkezi sinir sistemi ve karaciğer tutulumu da gözlenebilir.
- Hastalığın hayvanlarda belirtileri; yorgunluk, iştahsızlık, ağrı, ateş, enfeksiyona bağlı şişlikler, eklem problemleri ve süt veriminde azalma,
- Geleneğe bağlı tüketim alışkanlıkları sebebiyle, sütlerin çiğ veya az pişmiş olarak içilmesi,
- Çiğ veya yeterli ısıl işlem görmemiş sütlerden yapılan peynirlerin taze olarak tüketilmesiyle,
- Pastörize edilmemiş krema, kaymak ve tereyağı tüketimi önemli bulaşma kaynaklarıdır.

Bruselloz
Yıllara Göre Dağılımı 2008-2024



*Kesin Vaka
**Veri Kaynağı: 2008-2019 TSİM; 2020-2024 İZCİ; Erişim Tarihi: 09/05/2025.

Bruselloz
Hastalıktan Korunma

- Kaynağı belli olmayan hayvansal ürünler tüketilmemelidir.
- Pastörize edilmiş veya iyice kaynatılmış sütten yapılan ürünler (peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi) tercih edilmelidir.
- Salamura peynirler en az 3 ay bekledikten sonra tüketilmelidir.
- Sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanlar hemen bir veteriner hekime muayene ettirilmelidir.
- Atık yavrulara, yavru zarlarına çıplak elle dokunulmamalıdır.
- Hayvanların atıkları ve bu atıkların temas ettiği yemler etrafa bulaştırılmadan, sızdırmaz poşetler içinde gömülmelidir.
- Ahırda hasta hayvan varsa ve bu hayvanlarla temas halinde olanlarda ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülürse, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
- Hayvanlar mutlaka Bruselloza karşı aşılatılmalıdır.
- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir.
- Koruma ve kontrol önlemlerinde hayvan sağlığına ve insan sağlığına yönelik önlemler ve faaliyetler beşeri ve veteriner hekimliğin birlikte çalışması ile gerçekleştirilmelidir.

Şarbon
Genel Bakış

- Ülkemizde sığır, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır.
- Hastalık etkeni; Bacillus anthracis olan sporlu bir bakteridir.
- Hastalığın bulaşması; Deri (enfekte et,deri ve eşyalarına temas), Sindirim (enfekte gıdaları tüketme) ve Akciğer (şarbon sporlarını soluma) yoluyla bulaşan 3 türü bulunmaktadır.
- Hastalığın belirtileri; Ülkemizde genel olarak deri şarbonu görülmektedir. Deri şarbonunda lezyonlar genellikle vücudun açık yerlerinde görülür. Şarbon sporlarının deriden girdiği yerde, ilk önce böcek ısırığına benzer biçimde kabarık, kaşıntılı bir şişlik oluşur. Bu şişlik 1-2 gün içerisinde içi su dolu kabarcığa dönüşür ve daha sonrada ağrısız, genellikle 1-3 santimetre genişliğinde ortasında karakteristik siyah renkte ölü dokunun yer aldığı bir yara meydana gelir.
- Hastalığın hayvanlarda belirtileri; iştahsızlık, ayakta duramama, solunum güçlüğü, titreme, yüksek ateş, sancı, kan işeme ve ishal,
- Hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, kasaplar, mezbaha işçileri, dericilik sanayinde çalışanlar, veteriner hekimler, hastalığın yaygın olduğu bölgelerde ölen hayvanların kesildiği veya yerleşim yerlerine yakın ölen hayvanların gömüldüğü yerlerde oynayan çocuklar şarbon yönünden risk gruplarını oluşturmaktadır.

Şarbon
Yıllara Göre Dağılımı 2008-2024



*Kesin Vaka
**Veri Kaynağı: 2008-2019 TSİM; 2020-2024 İZCİ Erişim Tarihi: 09/05/2025.

Şarbon
Hastalıktan Korunma

- Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya şarbondan ölen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etleri tüketilmemelidir.
- Şarbondan şüpheli hayvan ölümleri derhal veteriner hekime haber verilmelidir.
- Şarbondan ölen hayvanlar 2 metre derinliğinde çukurlar açılarak gömülmelidir.
- Hasta hayvanların bulundukları yerler ve taşındıkları nakil vasıtaları temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
- Hasta hayvanların temas ettiği yemler, altlıklar ve gübre gibi bulaşık materyaller yakılarak imha edilmelidir.
- Riskli bölgelerde hayvanlar şarbona karşı aşılattırılmalıdır.

Tularemi
Genel Bakış

- Ülkemizde tavşan, fare ve sincap gibi kemirici hayvanlardan ve kenelerden insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır.
- Hastalık etkeni; Francisella tularensis olan bir bakteridir.
- Hastalığın bulaşması; İnsanlara bulaş genellikle bu hayvanlarla temas ve bu hayvanların her türlü atıkları ile kirlettiği sular aracılığıyla oluşmaktadır.
- Hastalığın belirtileri; hastalık kuluçka süresini takiben ani gelişen yüksek ateş, üşüme-titreme, halsizlik, iştahsızlık gibi semptomlar ile başlar. Mikroorganizmanın vücuda giriş yerine göre farklı klinik tablolar oluşur. Orofaringeal form, Ülseroglandüler form, Okülоglandüler form ve Glandüler form.
- Hastalığın hayvanlarda belirtileri; ateş, titreme, kas hassasiyeti, boğaz ağrısı, mide ağrısı ve kanaması, mide bulantısı ve halsizlik

Tularemi
Yıllara Göre Dağılımı 2008-2024



*Kesin Vaka
**Veri Kaynağı: 2008-2011 TSİM; 2012-2024 Tularemi Bilgi Sistemi Erişim Tarihi: 09/05/2025.

Tularemi
Hastalıktan Korunma

- Kaynağı belirsiz veya yeterince klorlama yapıldığından emin olunmayan suların kaynatılarak içilmesi,
- Suların ferdî dezenfeksiyonu ile özellikle av hayvanlarının yüzülmesi ve parçalanması esnasında eldiven kullanılması,
- Bu hayvanlara ait etlerin iyice pişirilerek yenmesi,
- Meyve ve sebzelerin bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmesi hastalıktan korunmada son derece önemlidir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Genel Bakış

- Ülkemizde kenelerden insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır.
- Hastalık etkeni; Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsüdür.
- Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum'dur.
- Hastalığın bulaşması; hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.
- Hastalığın belirtileri; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere sebep olur.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Yıllara Göre Dağılımı 2002-2024




Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalıktan Korunma

- Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.
- Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.

Kuduz
Genel Bakış

- Ülkemizde özellikle memeli hayvanlar başta olmak üzere neredeyse hayvan türlerinin çoğunda görülür ve insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır.
- Köpek, kedi, tilki, çakal ve kurt virüsün enfeksiyon zincirinin taşıyıcıları olan arakonakçılardır. Bu hayvanlar hastalığın varlığında önemli rol oynarlar ve etkeni son konakçı olan çiftlik hayvanlarına ve insanlara bulaştırırlar.
- Hastalık etkeni; Rhabdoviridae ailesinden Lyssavirus'un neden olduğu oldukça etkin bir profilaksisi olmasına karşın insanlarda ve birçok memeli hayvanda ölümcül seyreden ensefalomiyelite yol açan akut viral bir zoonotik hastalıktır.
- Hastalığın bulaşması; ağırlıklı olarak kuduz hayvanın ısırması ile olur. Mevcut yaralara enfekte salyanın bulaşması, tırmalama gibi mekanik ya da gıda yoluyla bulaşabildiği de bildirilmiştir.
- Hastalığın belirtileri; ateş, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, enfekte bölgede karıncalanma ve yanma, huzursuzluk, kaygı, kas spazmları, yutkunma güçlüğü, hidrofobi, halüsinasyon, ajitasyon, bilinç bulanıklığı, felç, bilinç kaybı ve dramatik bir ölüm gerçekleşir.
- Hastalığın hayvanlarda belirtileri; **1- Prodromal Dönem (Ön Belirti Evresi)** huzursuzluk ve davranış değişiklikleri, aşırı uysallaşma ya da agresifleşme, yeme ve içme alışkanlıklarında değişim, yaralı bölgeyi sürekli yalama veya çiğneme, hafif ateş, bu evre birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. **2. Furiyöz (Hırçın) Dönem** şiddetli saldırganlık, ısırma eğilimi, aşırı salya akışı, yutma güçlüğü (hidrofobi — sudan korkma), aşırı seslere, ışığa veya dokunmaya aşırı tepki, bu dönem, kuduzun en karakteristik belirtilerinin görüldüğü evredir. **3. Paralitik (Sessiz) Dönem** kas güçsüzlüğü, felçler (özellikle yutak ve bacaklarda), solunum felci, koma ve ölüm

Kuduz Riskli Temas
Yıllara Göre Dağılımı 2012-2024




Kuduz
Hastalıktan Korunma

- Yara veya ısırık bölgesi vakit kaybedilmeden bol su ve sabunla iyice yıkanmalı, yıkama işlemi bittikten sonra alkol veya tentürdiyot gibi iyotlu antiseptikler uygulanmalıdır.
- Göz, ağız veya burun kuduz riskli temasa maruz kaldıysa bol su ile yıkanmalıdır.
- En kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli, hekimin düzenleyeceği aşılama programı aksatılmadan uygulanmalıdır.
- Evcil hayvanlar kontrol altında tutulmalıdır.
- Kedi ve köpeklere her yıl mutlaka kuduz aşısı yaptırılmalıdır.
- Çevrede hasta, garip davranış sergileyen veya ölmüş hayvanların görülmesi halinde bunlara yaklaşılmamalı ve ilgili yerler (Belediyeler, Muhtarlıklar İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri) haberdar edilmelidir.
- Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas eden kişilere temas öncesi aşılama, kuduz riskli teması olanlara da hekim değerlendirmesine göre temas sonrası kuduz aşılaması uygulanmalıdır.

Kistik Ekinosuz
Genel Bakış

- Ülkemizde köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanların ince bağırsaklarında yaşadığı Echinococcus granulosus adı verilen parazitin larvalarının sebep olduğu zoonotik bir hastalıktır.
- Parazitin gerçek ara konakları koyun, keçi, sığır, domuz ve develer, son konakları ise köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır.
- Hastalık etkeni; Echinococcus granulosus adı verilen parazitin larvaları.
- Hastalığın bulaşması; Hastalık insanlara paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile etrafa yayılan parazitin yumurtaları ile kirlenmiş çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin yenmesi, suların içilmesi, rüzgar ile uçuşan yumurtaların solunum yoluyla alınması ve paraziti taşıyan köpekler sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması yoluyla bulaşır.
- Hastalığın belirtileri; Hastalığın belirtileri insanların organ ve dokularında oluşan kistlerin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterir. Kistlerin büyüklüğü nohut büyüklüğünden çocuk başı büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Hastalığın başlarında kistin küçük olduğu dönemlerde uzun yıllar boyunca hiçbir belirti vermeyebilir. Kist büyüdükçe; bulunduğu bölgeye ve oluşturduğu baskıya göre belirtiler ortaya çıkar. Kistler en sık karaciğer ve akciğerlerde görülürler. Karaciğer yerleşiminde karnın sağ üst kısmında ağrı, bulantı, kusma ve bazen kaşıntı, sarılık gibi belirti görülür. Akciğer tutulumunda solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı olabilir. Diğer organ ve sistem tutulumlarında da bu bölgelere ait tablolar ortaya çıkar.
- Hastalığın hayvanlarda belirtileri; karın bölgesinde ağrı, kilo kaybı, halsizlik, bulantı, kusma, sarılık

Kistik Ekinosuz
Yıllara Göre Dağılımı 2008-2019




Grafik 1. KE vakalarının yıllara göre dağılımı, Türkiye, 2008-2019

Kistik Ekinosuz Hastalıktan Korunma

- Köpek ve kedilere çiğ gıdalar ile kistli iç organlar kesinlikle yedirilmemelidir.
- Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
- Sahipli köpek ve kediler, muhakkak parazit yönünden tedavi ettirilmeli ve sahiplerince gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde mümkünse dışkı uygun bir şekilde toplanıp bertaraf edilmelidir. Köpekler, çocukların oyun oynadıkları oyun bahçesi, park, okul bahçesi gibi yerlerde dolaştırılmamalıdır.
- Belediyeler tarafından sahipsiz köpeklerin müdahaleleri yapılmalıdır.
- Köpekler parazit yumurtaları burunlarına ve tüylerine bulaştırabilirler. Parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere bulaşabilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağıza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu nedenle, özellikle çocukların sokak köpekleri ile oynamalarına izin verilmemeli, temas halinde ellerin bol su ve sabunla yıkanması sağlanmalıdır.
- Sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimi, hastalığın yayılmasında köpeklerden çok daha fazla etkilidir. Bu nedenle hayvan kesimleri, mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir. Kurban kesimi için belediyelerce tahsis edilen özel kesim yerleri kullanılmalı ve kesimler veteriner hekim gözetiminde yapılmalıdır. Kurban Bayramında kesilen koyunların kistli organları köpeklere yedirilmemeli, yakarak imha edilmeli ya da derin bir çukura gömülmelidir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetim Şeması



Veteriner İşleri Müdürlüğü Personel Durumu

- Müdür 1 Veteriner Hekim (Memur) (1)
- Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri Şefliği 1 şef Veteriner Hekim (Memur), 12 işçi şoför ve 43 işçi personel (3 Veteriner Hekim, 2 Veteriner Tekniker ve 1 Veteriner Teknisyen, 1 Kaynakçı,1 Boyacı,1 Sıhhi Tesisatçı) (55)
- Denetim şefliği 3 Veteriner Zabıta Memuru (Memur), 1 Veteriner Hekim (Memur) ve 1 işçi şoför (5)
- İdari İşler Şefliği 1 şef (Memur), 3 büro personeli (Memur) ve 8 işçi büro personeli ayrıca 1 daimi işçi şoför (13)
- Genel Toplam 10 (Memur) + 2 Daimi İşçi + 62 BİT İşçi olmak üzere **genel toplam 74 personel** ile hizmet vermekteyiz.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Araç Durumu

- 4 kiralık çift kabin yakalama aracı
- 2 kiralık çift kabin hayvan besleme aracı
- 1 kiralık idari işler aracı
- 1 kiralık denetim aracı
- 1 resmi plakalı ölü hayvan sevk aracı
- 1 resmi plakalı ölü hayvan toplama aracı olarak **genel toplam 10 araç** ile hizmet vermekteyiz.

1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Hayvanları koruma kanunu olan 5199 un revize olması ve yeni yönetmeliğin yayınlanması ile geçici olan bakımevimizi hayvan bakımevine dönüştürdük. Mevcut hayvan bakımevimiz 300 köpek 165 kedi olmak üzere toplam 465 sokak hayvanı kapasitesine sahip oldu.



1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

1379 adet köpek ve 2632 adet kedi gelen başvurular değerlendirilerek K.H.R.M.'ne alındı.






1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Bu alınan hayvanlar K.H.R.M.'de 16044 kez muayeneye tabii tutuldu.
Ayrıca 915 adet hasta köpek ve 1525 adet hasta kedinin günlük rutin tedavileri sürdürüldü.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

534 adet köpek ile 618 adet kedi K.H.R.M.'de kuduz aşı yapılarak aşılandı. Ayrıca 346 adet köpek ile 570 adet kedi K.H.R.M.'de mikroçip ile işaretlenerek takip edilebilmeleri sağlandı.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

335 adet köpek ile 572 adet kedi K.H.R.M.'de kısırlaştırılarak üremeleri durduruldu. Ayrıca 150 kişi tarafından oluşturulan randevudan 137 adet kedi hayvan severler tarafından randevulu getirilerek kısırlaştırılıp üremeleri durduruldu.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

1379 adet köpek ile 2628 adet kedi K.H.R.M.'de iç ve dış paraziter uygulamaları yapılarak insanlara bulaşacak zoonoz hastalıklar engellenmiş oldu.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

185 adet köpek ile 79 adet kedi K.H.R.M.'den sahiplendirilerek sokaklardan kurtulup sıcak bir yuvaya kavuşturuldu.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

61 adet köpek ile 14 adet kedi K.H.R.M.'de mikroçip kontrolü sonucu PETVET sisteminden sahipleri tespit edilip sahiplerine evrak ile teslim edildi.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

554 adet köpek (kapasite 300) ile 183 adet kedi (kapasite 165) K.H.R.M.'de günlük bakım, temizlik ve beslenmeleri yapılarak barındırıldı.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

215 köpek ve 206 kedi ve 14 diğer ile yabani hayvan ölüsü iletişim merkezinden gelen başvuru üzerine ölü toplama ekibimiz tarafından alınarak gömülmek üzere soğuk hava deposuna konuldu.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

556 adet kedi ve 296 yabani hayvan K.H.R.M.'den alındığı ortama sağlıklı bir şekilde bırakıldı.






1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

37 adet köpek ve 10 adet kedi iletişim merkezinden gelen ısırık vakası evrakına istinaden K.H.R.M.'de müşahede kafesine konulup, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince 1. Gün ve 10. Gün raporları tanzim edilip ilgili yerlere yazı ile bildirildi.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

K.H.R.M. 22 kurum ve 581 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Eylül ayı itibariyle çeşitli kurum ve okullar ziyarette bulundular.







1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

12 Adet hayvan beslemeye elverişli gıda maddesi verecek işletmeden günlük 200 kg. dan aylık 6000 kg. alınması sağlanarak; yaklaşık 54000 kg. hayvan beslemeye elverişli gıda maddesi ayrıştırılarak K.H.R.M.'deki sokak hayvanlarına verilmesi sağlanmıştır.



1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Mahallelerimizde bulunan 80 adet beslenme ve su odak noktalarına aylık olarak bırakılan toplam yaklaşık 1800 kg. olmak üzere toplam 16200 kg. kuru mamanın dağıtımı sağlanmıştır.






1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

335 adet köpek K.H.R.M.'de mikroçip ve kulak küpesi ile işaretlenip fotoğraflanıp HAYBİS'e girilerek hayvan başına verilen ücret Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli desteklenme alınması sağlanmıştır.





1-Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

K.H.R.M. de 311 kez dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır.






2-Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri

Öğrencilere hayvan sevgisi ve zoonoz hastalıklar konularında boyama kitabı ve 5000 adet broşür dağıtımı yapılmıştır.







2-Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri

Halkımıza ve öğrencilere zoonoz hastalıklar konularında Zoonoz Hastalıklar-1 isimli broşürden 5000 adet dağıtımı gerçekleştirilmiştir.





2-Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri

Halkımıza ve öğrencilere zoonoz hastalıklar konularında Zoonoz Hastalıklar-2 isimli broşürden 5000 adet dağıtımı gerçekleştirilmiştir.





2-Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri

Ölen hayvan ihbarları zoonoz hastalıklar yönünden değerlendirilip İnsan , Hayvan ve Çevre sağlığı açısından olumsuzluğa mahal vermemek için tutanak altına alınarak usulüne uygun bertarafları sağlanmak üzere İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ile koordine içinde çalışılmıştır.





3-Vektör Mücadele Hizmetleri

Vektör üreme alanları Veteriner İşleri Müdürlüğümüzdeki personellerce her yıl kontrol edilerek yeni üreme alanlarının (Jit Alan) oluşması veya eski üreme alanlarının yok olması gibi durumların bildirilmesi içinde İ.B.B. Başkanlığı ile koordineli çalışılarak halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınması sağlanmıştır.



Yalnız bu akarsuların kıyılarında çevrinti kesimlerinde taşlar, yeşil su bitkileri ve yosunlararasında su akışının azaldığı yerlerde tutunabilirler.Otlar, sazlar ya da kamışların olduğu yosun bürümüş akarsu ve göllerin kıyılarında, sulak yerlerin çevresindeki hayvanların bıraktığı ayak izleri çukurları içerisinde çok iyi gelişme fırsatı bulabilirler.

Sivrisineklerin Konak Seçmeleri:

Birçok kimsenin zannettiği gibi sadece sıcakkanlıları ve özellikle insanları değil keza türlerin % 15'i konakçı olarak kurbağaları ve sürüngenleri tercih etmektedirler. Sivrisinekler daha çok sıcakkanlı hayvanlardan (memeliler ve kuşlar) kan emerler.Bazı türler iç mekânlarda konaklarına saldırıp kan emerken, bazı türler açık alanlarda saldırmayı tercih ederler.

Sivrisineklerin Uçma Gücü:

Sivrisinekler 300-1000 m yüksekliklere çıkabilmektedirler.

Sivrisineklerin Sağlık Açısından Önemleri:

Farklı konaklardan kan emmeleri yolu ile birçok hastalığın aynı türün bir bireyinden diğer bir bireyine veya bir türden başka bir türe geçişine neden olmaktadırlar. Sivrisinekler tarafından taşınabilen veya bulaştırılabilen hastalıklara Sıtma,Sarıhumma, Batı Nil Ateşi, Ensefalit vb. gibi hastalıklar örnek verilebilir.

Sivrisineklerin Kontrolü:

En başta yapılması gereken korunma yollarının ve sivrisinekle mücadelenin bilinçlendirmenin sağlanması adına halka anlatıldığı **Kültürel Mücadele** yapılmalıdır. Sivrisinekle mücadelenin anahtarı gelişimin gerçekleştiği suların kontrolünden geçmekte ve eğer kaynak yerinde kontrol edilirse, durgun su olmazsa sivrisinek de olmazdan hareketle ilk yapılması gereken kaynakların azaltılması ve yok edilmesine yönelik **Fiziksel Mücadele** olmalıdır. Eğer bunda yeterince başarılı olunamıyorsa sırasıyla **Biyolojik Mücadele** (Larvalara karşı; Gambusia Balığı, Bacillus Bakteri Toksini, Spinosad, Diğer Balıklar, Böcekler ve Örümcekler vs. Erginlere karşı; Kuşlar, Kurbağalar, Yarasalar, Böcekler ve Örümcekler vs.) ve buda yeterli gelmiyorsa **Kimyasal Mücadele** 'ye başvurulmalıdır.

Sakin'de hayat var

SİVRİSİNEKLER
Sivrisineklerle İlgili Genel Bilgi:

Sivrisinekler özellikle durgun havalarda kan emecekleri (konak) etrafında uçuşarak çıplak olan yüz, el, kol ve bacak gibi vücut bölgelerinden kan emmeye çalışırlar. Kan emilen yerde rahatsız edici kaşıntı meydana getirmelerinin yanı sıra, çok sayıda ülkede gittikçe sıklığı artan birçok bulaşıcı hastalığın vektörlüğünü (taşıyıcı) yaparlar.

Sivrisineğin Hayat Döngüsü:

1. Dönem: **Yumurta (Su Habitatı)**
2. Dönem: **Larva (Su Habitatı)**
3. Dönem: **Pupa (Su Habitatı)**
4. Dönem: **Ergin (Kara Habitatı)**

Sivrisineklerin gelişimlerinin yumurta, larva ve pupa evreleri su içerisinde gerçekleşmesine karşın ergin hali karada devam etmektedir. Yumurtadan ergin bireye kadar olan süreç yaklaşık iki hafta kadar sürmektedir. Türlere göre değişmekle birlikte su sıcaklığı 12-32°C yumurtadan embriyonun gelişmesi için uygun koşullar kabul edilse de 23-25°C ideal sıcaklık dereceleridir. Bir sivrisinek dişisi türlere göre 50–470 arası sayıda yumurta bırakabilir.

Sivrisineklerin Özellikleri:

Ergin bireyler ince yapılı, başları küçük, gözleri iri, antenleri ve hortumları ince uzun yapılı, kanatları dar ve uzun yapılı, boyları 3–12 mm arasında değişen bireylerdir.

Sivrisineklerin Yaşama Yerleri ve Gelişmeleri:

Her çeşit göl, bataklık, doğal çukurlar, taş oyukları, ağaç kovukları, çayır ve ormanlarda birikmiş kar ve yağmur suları, yosunlarla sarılmış durgun su odakları, kullanılan veya bırakılmış su sarnıçları, havuzlar, çeltik üretim tarlaları, sulama kanalları, açıkta kalan lağımsuları, fabrika ve drenaj kanalları gibi yerlerdeki temiz, az tuzlu, kirli sular, otomobil mezarlıkları, konutların çevresine bırakılan fıçı, varil, otomobil tekerleği, kova ve saksı tipi yerler sivrisineklerin üreme yerleridir. (jit) Saniyede 40 cm hızla akan sularda larvalar tutunamazlar ve yaşama olanağı bulamazlar.

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİVRİSİNEKLERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



3-Vektör Mücadele Hizmetleri

Karasinek ve sivrisinek mücadelesinin etkin bir şekilde yapılmasının temelini oluşturan halkın bilinçlendirilmesini sağlayan kültürel mücadele için vatandaşlarımıza karasinek ve sivrisinek ile ilgili 5000 er adet broşürün dağıtımı sağlanmıştır.



Karasineklerin Konak Seçmeleri:

İnsanların yaşam alanlarında bulunan bütün sinekler içinde yaklaşık %90'lık bir dilimi oluştururlar.

Karasinek popülasyonları, insan nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yoğundur. Aynı şekilde memelilerin bulunduğu popülasyonlarda da yoğun olarak bulunabilirler.

Karasineklerin Uçma Gücü:

Karasinekler ortalama 3 km uçarak çevrede insanların yaşadığı her yeri istila ederler ve vücutlarında çok çeşitli hastalık mikropları taşıdığı için her dolaştığı şeye mikrobu bulaştırırlar.

Karasineklerin Sağlık Açısından Önemleri:

Karasinekler tarafından bulaştırılabilen hastalıklara Kolera, Diyare, Dizanteri, Hepatit, Çocuk Felci, Gıda Zehirlenmeleri, Salmonelloz, Verem vb. gibi hastalıklar örnek verilebilir.

Karasineklerin Kontrolü:

En başta yapılması gereken korunma yollarının ve karasinekle mücadelenin bilinçlendirmenin sağlanması adına halka anlatıldığı **Kültürel Mücadele** yapılmalıdır. Karasineklerin en çok üreme alanı olan insan-hayvan pislikleri, çöplükler, lağım çukurları, kümes hayvanlarının pislikleri, hayvan gübrelikleri, mezbaha çevresi ve hayvan ahırları, ev, işyeri, vb. yerlerin, çöp toplama alan ve bidonları ile kanalizasyonlar gibi üreme alanlarının yok edilmesine yönelik **Fiziksel Mücadele** olmalıdır. Eğer bunda yeterince başarılı olunamıyorsa sırasıyla **Biyolojik Mücadele** genelde kuşlar, örümcekler, parazit arılar, bakteri ve fungusların kitle halinde üretilip karasineklerle biyolojik mücadele uygulanabileceği bilinmekle birlikte pratikte sadece bazı parazitoid arıcıkların karasinek pupalarında etkili oldukları bilinmektedir ve buda yeterli gelmiyorsa Kimyasal Mücadele 'ye başvurulmalıdır. **Kimyasal mücadele** genelde kalıcı (rezidüel) uygulama ve alan uygulaması (açık ve kapalı alan) şeklinde yapılmaktadır.

Sinri'de hayat var

KARASİNEKLER
Karasineklerle İlgili Genel Bilgi:

Karasinekler özellikle (konak) üzerine konarak (yüz, el, kol ve bacak gibi vücut bölgelerine) veya etrafında uçarak rahatsızlık verirler. Çok sayıda ülkede birçok bulaşıcı hastalığın vektörlüğünü (taşıyıcı) yaparlar.

Karasineğin Hayat Döngüsü:

1. Dönem: **Yumurta**
2. Dönem: **Larva**
(1.-2. ve 3. Larva Dönemi geçirir)
3. Dönem: **Pupa**
4. Dönem: **Ergin**

Karasinekler yumurtalarını dışkılara, çöplüklere, özellikle sıcak ve nemli yerlere bırakırlar. Yumurtalar uygun koşullarda bir günden kısa bir sürede çatlar ve larvalar çıkar. Larvalar bir iki hafta içinde pupa evresine girerler. Pupa evresinde başkalaşmaya uğrayarak birkaç günde kanatlı erişkin biçimlerini alırlar. Dişi karasinek her yumurtlamada ortalama 100'ün üzerinde yumurta bırakır. Sıcaklığa bağlı olarak yılda 10-30 nesil (döl) verirler. İdeal bir üreme yeri olan inek dışkısının yaklaşık bir kilogramında 15.000 karasinek gelişebilir. Beslenme şekli nedeni ile Kolera, dizanteri, hepatit, tüberküloz, gıda zehirlenmeleri gibi hastalık etkenlerini insanlara bulaştırırlar.

Karasineklerin Özellikleri:

Uzunluğu 5-8 mm arasında değişen, rengi genel olarak koyu gri ve siyah olan ve uçabilen bir sinek türüdür.

Karasineklerin Yaşama Yerleri ve Gelişmeleri:

İnsan-hayvan pislikleri, çöplükler, lağım çukurları, kümes hayvanlarının pislikleri, hayvan gübrelikleri, mezbaha çevresi ve hayvan ahırları, ev, işyeri, vb. yerlerin, çöp toplama alan ve bidonları ile kanalizasyonlar gibi yerler karasineklerin üreme yerleridir.(jit) 35 C sıcaklıkta yumurtadan ergin çıkışı 7-8 gün kadar kısa bir sürede tamamlanır. Ergin dişiler 4. günde yumurta bırakmaya başlarlar. Uygun çevre koşullarında; 1 dişi karasinekten, 6 nesil sonrasında 100 milyar civarında bir populasyon meydana gelebilir.

T.C. SILIVRI BELEDİYESİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARASİNEKLERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



4-Sahipli Hayvan Kontrol Denetim ve Kayıt Tescil Hizmetleri

Sahipli hayvanlar ile ilgili ; ilgili kurumdan gelen görevlendirme talebine istinaden iletişim masasından ve kolluk güçleri tarafından gelen ihbarlar değerlendirilerek 657 sahipli hayvanın sağlık kontrolleri yapılarak mikroçip ile kimliklendirilip kayıt altına alınmıştır.





4-Sahipli Hayvan Kontrol Denetim ve Kayıt Tescil Hizmetleri

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında Kaymakamlıktan gelen görevlendirme talebine istinaden ; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden istenilen ruhsatlı yerler listesindeki 185 yerin denetimleri gerçekleştirilmiş olup; 1 işletmenin faaliyetine son verdiği tespit edilmiştir.





5-Kurban Hizmetleri

Kurban kesen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kestikleri hayvanlardan sağlık yönünden şüphelendiklerinden tarafımıza ulaşarak et muayenesi yapılmış ve imhası gerekenler tutanakla imha edilmiştir. Zoonoz hastalıklar yönünden gerekli ilaçlamalar da Veteriner Hekimlerimizce yapılmıştır. İlçemizde 1 satış yeri ve 99 kesim yeri ile ilgili gerekli denetimler yapılarak izin almaları sağlanmış olup kurban zamanı da ring halinde denetlenmeleri sağlanmıştır. Böylelikle tüm çalışmalarımız sonunda zoonoz hastalıkların çıkması engellenmiştir.





5-Kurban Hizmetleri

Satış alanına 3 adet Karantina çadırı kurulumu yapılarak yine 2 adet canlı hayvan kantarı kurulumu da yapılıp vatandaşlarımızın bu hizmetlerden ücretsiz yararlanması sağlanmıştır. Sosyal donatı alanlarımız diğer müdürlüklerimiz ile beraber titizlik ile elden geçirilerek vatandaşlarımızın sorunsuz bir kurban bayramı geçirmesi sağlanmıştır.






5-Kurban Hizmetleri

Kurban satış alanında hayvanların dış parazit yönünden gerekli ilaçlamaları, muayeneleri, ortamın temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanarak zoonoz ve bulaşıcı hastalık çıkmaması için hayvanların satış alanına girdiği 15 gün öncesinden kurban bayramının son gününe kadar gerekli çalışmalar yapılmıştır.





5-Kurban Hizmetleri

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı Çalışma Birimi ile ortaklaşa hazırladığımız Kurban ile ilgili 7000 adet broşür bastırarak halkımıza dağıtımı yapılmış olup ; Ayrıca vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için kesim alma rehberi hazırlanarak Belediyemizin Web sitesinde yayınlanmıştır.



Kurbanlık Hayvan Seçerken;

Bulaşıcı hayvan hastalıkları nedeni ile kurbanlık hayvanın, satın alınırken ve kesim öncesinde Veteriner Hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir.

- o Resmi Veteriner Sağlık Raporu olmayan,
- o Büyükbaş hayvanlarda küpesiz ve kimlik kartı (pasaportu) bulunmayan,
- o Gebe veya yeni doğum yapmış olan,
- o Yüksek ateşi olan,
- o İştahsızlığı olan,
- o Öksürüğü, nefes güçlüğü olan,
- o Yutma zorluğu olan,
- o Kısmi veya genel felçli olan,
- o Tüyleri karışık ve mat halde olan,
- o Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan,
- o Salya akıntısı bulunan,
- o Anormal kokulu ishali olan,
- o Çevreye karşı anormal tepkili veya çok duyarsız,
- o Gelişimini tamamlamamış genç hayvanların satın alınmaması ve kesilmemesi gerekmektedir.

Kesimden Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu süreçte hayvanın;

- o Çevreye uyumuna,
- o Ayakta durma ve hareket tarzına
- o Beslenme durumuna
- o Tüylerinin durumuna
- o Sindirim sistemine (salgı çıkarmasına, geviş getirmesine, dışkının kıvamına ve rengine)
- o Üreme organlarına ve meme bezlerine
- o Solunum sistemine (burun salgısına, solunum durumuna)
- o Yara, şişlik, ödem gibi anormal oluşumların

var olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Kesimden Sonra Nelere Dikkat Edilmelidir?

- o Kurban etleri parçalamanın hemen ardından temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yere alınarak kesim ısıklığının oda sıcaklığına düşmesi beklenmeli (5-6 saati geçmeyecek şekilde) daha sonra buzdolabı ısısında 24 saat bekletilmeli, kısa sürede tüketilmeyecek ise -18°C soğutuculara kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Dondurulmuş et çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.
- o Sakatat çok kısa sürede bozulduğundan birkaç gün içinde tüketilmelidir,
- o Kurban atıkları gelişigüzel çevreye, çöp varillerine, kanalizasyon kanallarına atılmamalı, belediye görevlilerine teslim edilmeli, belediye görevlilerinin bulunmadığı mahallerde sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara sıhhi bir şekilde gömülmelidir.

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI 1954

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ

KURBANLIK HAYVANLARIN SATIŞ, KESİM VE KESİMDEN SONRAKİ TÜM AŞAMALARININ VETERİNER HEKİM GÖZETİM VE DENETİMİNDE YAPILMASI İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

Her yıl Kurban Bayramında milyonlarca kasaplık hayvan kesilmektedir. Kurbanlık hayvanlar bir çok hastalığın kaynağı olabilir ve bu hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Kurban Bayramı hayvanlardan insanlara geçebilen bu hastalıkları artırıcı yönde rol oynayan bir faktördür. Özellikle kurbanlık hayvanların sokakta dolaştırılmaları, meydanlarda bekletilmeleri, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarında tutulmaları, uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır. Çok sayıda kurbanın aynı zamanda uygunsuz koşullarda kesilmesi gerek halk sağlığı gerekse çevre sağlığı açısından ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. Veteriner Hekim kontrolü yapılmadan kesilen hayvanlardan elde edilen etler halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Kesim sırasında ortaya çıkan kan, mide bağırsak içeriği ve kullanılmayan kısımlar gelişigüzel çevreye atılmakta, hastalıkların yayılmasına, hastalıkların hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara bulaşmasına, çevrenin kirlenmesine ve toplum sağlığının bozulmasına sebep olmaktadır. Türkiye ve pek çok komşu ülkede bruselloz, kist hidatid, sistiserkoz, sarkoplazmoz, verem, şarbon gibi hastalıklar günümüzde hala görülmekte ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam etmektedirler. Bu hastalıklardan ileri gelebilecek tehlikenin azaltılabilmesi veya önlenebilmesi için öncelikle hastalıkların hayvanlarda kontrol altına alınarak insanlara bulaşması önlenmelidir.

Bu yüzden kurbanlık hayvanlar Veteriner Hekim denetimi bulunan Belediyelerce belirlenen hayvan satış yerlerinden alınmalı, asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip Veteriner Hekim kontrolü bulunan kesim yerlerinde kesilmeli ve tüketiciye sağlıklı şekilde ulaştırılmalıdır.





Kesim sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Kesim öncesi kurbanlık hayvanların yorgun olmaması ve kesimden önce 12 saat boyunca yem verilmemesi gereklidir (su verilebilir), Kurbanlık hayvanları kesim öncesi strese sokacak kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınmalıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir:

- o Kurbanlar, belediyelerce belirlenmiş teknik ve hijyenik şartlara sahip yerlerde kestirilmelidir.
- o Kesim yeri temiz olmalı ve basınçlı su bulunmalıdır.
- o Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir,
- o Kesim işlemi tecrübeli-ehil kişilerce yapılmalı, kesim yapan kişi sağlıklı ve temiz olmalı, karkastan kendisine ve karkasa bulaşabilecek muhtemel hastalıklara karşı gerekli tedbirleri (önlük ve çizme giymek, kesik/yaralı elle ete temas etmemek gibi) almalıdır,
- o Kesim askıya alınarak yapılmalı, kanın mümkün olduğunca iyi akıtılması sağlanmalıdır.
- o Deri yüzülürken zarar verilmemelidir.
- o İç organlar; yüzme işlemini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır.
- o Tüketilecek sakatat, çıkarılmasını takiben etlerden ayrı, temiz bir kaba alınmalıdır.
- o Kesim ve parçalama sırasında hastalıklı doku ve organlara temas eden veya kirlenen bıçaklar yıkanıp dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır.
- o Mide-bağırsak, safra-idrar kesesi ve üreme organları delinmeden, parçalanmadan çıkarılmalıdır. Bağırsaklar çıkarılırken çıkışı bağlanarak içeriğinin akması, karkasın kirlenmesi önlenmelidir.
- o Kesim sırasında, çevre ve toplum sağlığı açısından kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir.

Hayvanların Veteriner Hekim kontrolünde kesilmesi çevre ve toplum sağlığı açısından bir gereklilik olup aşağıdaki durumlarda derhal Veteriner Hekime başvurulmalı, hayvanın derisi, bütün iç organları ve gövdesi kullanılan alet ve ekipmanlar dahil Veteriner Hekim gelinceye kadar serin bir yerde muhafaza edilmelidir.

- o Kesilen hayvanın kanı siyaha yakın koyulukta ise ve geç pıhtılaşıyorsa,
- o Dalakta 3-5 misli anormal bir büyüme görülüyor ve kesildiğinde içi siyahımsı bir kan içeriyorsa,
- o Etin veya yağların rengi aşırı sarıysa,
- o Bağırsaklar aşırı derecede gazla dolu ve iç kısımlarında yer yer kanamalar varsa,
- o Lenf yumrularında aşırı şişlik, iltihap, kireçlenme veya peynirimsi bir görünüm tespit edilirse,
- o Karaciğer büyümüş ve yüzeyinde beyaz noktacıklar, sert oluşumlar, içi su dolu kesecikler mevcutsa,
- o Yüzülen derinin iç kısımlarında kanamalar veya anormal lekeler mevcutsa,
- o Gövdenin iç kısmında irili ufaklı yuvarlak oluşumlar kireçlenmiş odaklar varsa derhal Veteriner Hekime danışılmalıdır.

6-Gıda İş Yerlerinde Ruhsat ve Hijyen Denetim Hizmetleri

Hayvansal kökenli gıda ürünleri üreten ve satan sıhhi işyerlerinin listesi Zabıta Müdürlüğünden alınarak 337 adet ruhsatlı yerin 674 adet denetimi denetim planı doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup 27 adet işletmenin faaliyetine son verdiği tespit edilmiştir.





7-Eğitim Hizmetleri

Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinin öğrencilerinin Klinik Uygulamaları Öğretim Üyelerinin nezaretinde tam donanımlı olan K.H.R.M.de yapılmıştır.





8-Mesleki Hizmetleri


İlçemiz okullarında ilköğretime yeni başlayan 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz ile anasınıflarındaki öğrencilerimizin K.H.R.M. ziyaretlerinde broşürlerimizin dağıtımını ve yaptıklarımız ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdik.





9-İdari İşler

2315 Adet gelen evrakın değerlendirilmesi için dosyalanarak ilgili şefliklere aktarılması sağlandı. 1811 Adet giden evrakın çıkışı sağlandı.
293 Adet CİMER evrakı incelenerek işleme tabi tutularak cevap yazıları yazıldı.8945 Adet gelen iletişim merkezinin evrakı yakalama ekiplerine verilerek sonuçlandırılıp ilgililerine bilgi verildi.
Vatandaşımız tarafından 24 adet teşekkür başvurusu yapılmıştır.





T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ

SİLİVRİ BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Burçin SARISALTIKOĞLU

Veteriner İşleri Müdürü

Veteriner Hekim

Teşekkür Ederim